



Marcação

Segunda à sexta-feira de 7:00 às 19:00h e sábado de 7:00 às 13:00h.

Telefone

(71) 2102-8555

Local

Térreo

### **Sobre o Exame**

O ecocardiograma é um exame de ultrassom que permite a análise da anatomia e função do coração e parte dos grandes vasos. O Ecocardiograma de esforço ou sob stress farmacológico permite que esta análise seja realizada com o coração em repouso e sob estresse, através da administração de medicamentos durante o exame (dobutamina)

### **Como é feito o exame?**

Durante o exame, o paciente permanece deitado, enquanto o médico capta imagens, através de um aparelho de ultrassom, que permitem a análise das estruturas e funcionamento cardíaco. Para realizar esta análise com o coração sob esforço (semelhante ao obtido durante o teste ergométrico ou teste de esforço), o médico administra medicamentos, via venosa ao longo do exame. É necessário uso de gel no local a ser avaliado. O exame dura aproximadamente 30 minutos.

Após concluído o exame, o paciente permanece em repouso durante 30 minutos, e após 60 minutos, pode retornar à sua rotina, sem restrição de dieta.

### **Preparo Prévio**

Procurar ter um sono adequado no dia anterior ao exame.

Evitar a realização de exercício físico e o consumo de bebidas alcoólicas no dia anterior ao exame.

Evitar a ingestão de café na última refeição prévia a realização do exame.

Jejum de absoluto (sólidos e líquidos) nas 4 (quatro) horas prévias a realização do exame.

Manter medicamento de uso contínuo, ingerindo a medicação com mínimo de água possível.

Importante: Para diagnóstico de doença arterial coronária, caso seja autorizado pelo médico assistente do paciente que solicitou o exame, a recomendação é realizar o ecocardiograma com estresse farmacológico sem o uso remédios que possam mascarar as manifestações isquêmicas, como betabloqueadores, inibidores dos canais de cálcio e vasodilatadores coronarianos (vide tabela abaixo).

Tabela: Medicamentos que podem interferir no resultado do exame e que devem ser suspensas.

A suspensão dessas medicações só deve ser realizada sob orientação do médico assistente do paciente,

que solicitou o exame.

Tabela: Medicacões que podem interferir no resultado do exame e que devem ser suspensas.

A suspensão dessas medicacões só deve ser realizada sob orientacão do médico assistente do paciente,

que solicitou o exame.

Princípio Ativo	Nome Comercial	Dias recomendados de suspensão prévia da medicacão
Carvedilol	Divelol; Ictus: Cardilol, Carvedilat, Coreg	02 dias antes do exame
Propranolol	Inderal, Rebaten	03 dias antes do exame
Atenolol	Atenolol, Angipress, Ablok	03 dias antes do exame
Metoprolol	Selozok	03 dias antes do exame
Bisoprolol	Concor	03 dias antes do exame
Diltiazem	Balcor, Diltiazem, Cardizem	03 dias antes do exame
Verapamil	Dilacoron	03 dias antes do exame
Nebivolol	Nebilet	03 dias antes do exame